



UTILISATION D'HERBICIDES DANS L'OIGNON

1. Plantations établies avec les oignons de mars

(a) En pré-émergence des herbes et de l'oignon

Ronstar 1 $\frac{3}{4}$ litres/60 gallons d'eau/arpent
OU
Preforan 3 " " "

(b) En post-émergence, à partir du stade de la 3e feuille de l'oignon

Ronstar 1 $\frac{3}{4}$ litres/60 gallons d'eau/arpent

2. Oignon transplanté

Quelques jours après la transplantation

Ronstar 1 $\frac{3}{4}$ litres/60 gallons d'eau/arpent
OU
Preforan 3 " " "

3. Semis d'oignon

Les variétés *Red Creole* et *Red Star* se sont montrées tolérantes au traitement en pré-émergence recommandé ci-dessous:

Preforan à 1 $\frac{1}{2}$ litres/60 gallons d'eau/arpent

Avant d'utiliser ce traitement pour les autres variétés, il faudrait faire un essai sur une petite superficie.

L'on peut aussi adopter la technique suivante:

- préparer les planches
- attendre la levée des herbes
- semer les graines d'oignon
- épandre

Gramoxone à $\frac{3}{4}$ litre/arpent

- quand les jeunes plants d'oignon atteignent le stade de la troisième feuille, utiliser

Ronstar à 1 litre/arpent