

## **MAURITIUS SUGAR INDUSTRY RESEARCH INSTITUTE**

Recommendation Sheet No. 15 (July, 1981)

## CONTROLE DES MAUVAISES HERBES DANS LES PLANTATIONS DE POMME DE TERRE

Depuis quelques années, deux herbicides sont recommandés dans la pomme de terre: Sencor et Linuron. Un troisième herbicide, Topogarde, testé en plusieurs occasions, a donné de bons résultats et peut aussi être utilisé.

Ces produits doivent être appliqués en pré-émergence de la pomme de terre et des herbes aux taux indiqués ci-dessous:

Sencor 1 1b m.a. (1 $\frac{1}{4}$  1b du produit commercial) ) dans 60 gallons OU Linuron 2 - 2 $\frac{1}{2}$  1b m.a. (4-5 1b du produit commercial) ) d'eau par arpent OU Topogarde 3 litres du produit commercial )

Si la pomme de terre est plantée en interlignes de canne à sucre, les même produits peuvent être utilisés car ils ne constituent aucun danger pour la canne.

En post-émergence de la pomme de terre seul le Sencor est recommandé au même taux pourvu que l'application soit faite avant que la pomme de terre n'atteigne 10 cm de haut. Il est toutefois préférable d'avoir recours aux traitements en pré-émergence.