



# MAURITIUS SUGAR INDUSTRY RESEARCH INSTITUTE

Recommendation Sheet No. 2  
(January 1981)

## CONTROLE DU CYNODON DACTYLON (Chiendent)

### Entre deux rotations

#### Premier choix

Roundup à 5 litres/60 gallons d'eau/arpent

en post-émergence de l'herbe.

Il faut que l'herbe soit en train de pousser activement de façon à ce qu'elle absorbe le produit. Cependant, s'il pleut dans les six heures suivant l'application, le contrôle sera inférieur.

Il ne faut pas remuer le sol avant un mois suivant l'application.

#### Deuxième choix

TCA 25 lb + Dalapon 10 lb/60 gallons d'eau/arpent

toujours en post-émergence de l'herbe. Les mêmes conseils donnés plus haut s'appliquent ici mais en plus, la plantation de canne ne doit pas se faire avant six semaines après l'épandage à cause de la rémanance du Dalapon.

### En cannes vierges et repousses

En post-émergence de l'herbe

TCA 15 à 20 lb/60 gallons d'eau/arpent

Quand la canne a atteint une hauteur d'au moins 120 cm, l'on peut appliquer

Roundup à 5 litres/60 gallons d'eau/arpent

en évitant le feuillage de la canne parceque des dommages sérieux pourraient être causés à celle-ci.